

UBND TỈNH THÁI BÌNH  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT  
TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 218/SNN&PTNT

Thái Bình, ngày 17 tháng 02 năm 2018

V/v tăng cường công tác chăm sóc phòng  
trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ Xuân 2018.

Kính gửi:

- UBND huyện, thành phố;
- Phòng NN&PTNT huyện, phòng Kinh tế Thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp.

Đến ngày 27/02/2018, toàn tỉnh gieo cấy được khoảng trên 72.000ha, trong đó lúa gieo thẳng khoảng 30.000ha. Một số nơi do ruộng khô, tuyến trùng hại rễ lúa ở các ruộng gieo thẳng đã xuất hiện và gây hại cục bộ. Để sản xuất vụ Xuân 2018 dành thắng lợi, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND huyện, Thành phố, yêu cầu phòng NN&PTNT huyện, phòng kinh tế Thành phố và các đơn vị trong ngành tập trung chỉ đạo nông dân một số biện pháp sau:

1. Huy động nông dân khẩn trương gieo cấy lúa xuân, đảm bảo việc gieo cấy kết thúc trong tháng 02/2018; giữ nước nông mặt ruộng để lúa xuân sinh trưởng phát triển kịp thời, hạn chế tình trạng "lúa chiêm chết se, hè chết úng" đồng thời phải khẩn trương đưa nước vào ruộng lúa gieo thẳng để hạn chế sự phát sinh và gây hại của Tuyến trùng hại rễ lúa.

2. Tuyên truyền hướng dẫn các địa phương và nông dân các biện pháp kỹ thuật tía dặm, chăm sóc cho lúa xuân kịp thời, đảm bảo mật độ gieo thẳng khoảng 100-110 dảnh/m<sup>2</sup>, 2-3 dảnh/ khóm đối với lúa thuần, 1-2 dảnh/ khóm với lúa lai; không để mạ dư thừa trên ruộng lúa cấy để hạn chế tình trạng bệnh đạo ôn, khô vằn phát sinh và lây ra diện rộng, bảo quản tốt diện tích mạ còn dư thừa tại nơi gieo để dự phòng khi thời tiết có diễn biến bất thường; chủ động phun phòng bệnh đạo ôn trên các giống lúa nhiễm bệnh như BC15, Q5, nếp địa phương khi xuất hiện vết bệnh.


3. Kiểm tra rà soát toàn bộ diện tích lúa gieo thẳng phát hiện sớm nhất các triệu chứng cây lúa: Cây bị lùn, lá hơi vàng, sinh trưởng chậm. Nhổ rễ lên, thấy rễ vẫn trắng nhưng bị ngăn lại, bướu xuất hiện ở nhiều đoạn của rễ hoặc ở chóp rễ. Nơi có ổ tuyến trùng bị phù to tạo bướu 1-2mm. Khi bị tuyến trùng ký sinh, cây lúa bị bệnh bướu rễ sẽ bị chết khi còn non (2-3 lá) và phát triển chậm khi cây lúa ở giai đoạn 4 lá trở đi. Để phòng trừ tuyến trùng hại rễ lúa cần phải thực hiện các biện pháp sau: cần cho nước vào ruộng khoảng 1-2cm và giữ liên tục 5-7 ngày, bón vôi với lượng từ 20-

25kg/sào, sử dụng một số chế phẩm cải tạo đất và tăng cường khả năng ra rễ mới cho lúa đồng thời kết hợp với việc phun hoặc rắc thuốc BVTV để phòng bệnh Lùn sọc đen và và Tuyến trùng hại trên lúa gieo thẳng.

4. Tranh thủ thời tiết ẩm bón lót và bón thúc kịp thời cho lúa xuân, bón ngay sau khi lúa bắt đầu đẻ nhánh bằng NPK chuyên thúc với quan điểm bón nặng đầu nhẹ cuối và tăng cường bón thêm lân Supe, phân kali hoặc các dạng phân N.P.K giàu lân cho lúa xuân./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- GD sở Nông nghiệp và PTNT;
- VP tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- Lưu VT./.



Nguyễn Thị Nga