

Số: /HD-TTBVTV

Thái Bình, ngày tháng 4 năm 2023

HƯỚNG DẪN

Phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ Xuân năm 2023

Từ ngày **03/5 - 07/5 năm 2023** trên đồng ruộng có đợt sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại nở rộ, bệnh đạo ôn cổ bông có nguy cơ gây hại cao trên giống nhiễm ở giai đoạn lúa trổ bông nếu không có các biện pháp phòng trừ kịp thời thì các đối tượng dịch hại sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lúa Xuân. Để đảm bảo an toàn sâu bệnh trên đồng ruộng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật như sau:

*** Thời gian tổ chức phòng trừ: Từ ngày 03/5 - 07/5/2023.**

1. Sâu cuốn lá nhỏ: Phòng trừ trên những diện tích có mật độ sâu non từ 20 con/m² trở lên. Những diện tích lúa có mật độ sâu non cao từ 200 con/m² trở lên sau phun thuốc 5 ngày cần kiểm tra lại và chủ động phun lại lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày nếu mật độ sâu sống còn trên 20 con/m² trở lên.

* Đối với sâu cuốn lá nhỏ khuyến cáo nông dân nên dùng một trong các loại thuốc sau: Emin Gold 160SC pha 5,4 ml; Ammate 150EC pha 5ml; Voliam targo 063SC pha 15ml; Clever 150SC pha 6ml (300WG pha 3gam); Obaone 95WG pha 10 gam; Sunset 300WG 3,8 gam; August 350WG pha 3 gam; Indogold 150SC pha 7,5 ml; Diretor 70EC pha 25 ml;... với 16 - 20 lít nước phun cho 1 sào để phòng trừ.

2. Rầy các loại: Ở đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ này cần kết hợp với phòng trừ rầy cho những diện tích có mật độ rầy từ 800 con/m² trở lên. Khuyến cáo nông dân nên sử dụng một trong các loại thuốc sau: Chess 50WG; Penalty 40WP; Oshin 20WP; Midan10WP; Sutin 50SC; Schezgold 500WG ... để phòng trừ.

3. Bệnh đạo ôn cổ bông:

- Các giống lúa mẫn cảm, nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông phải được phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông 2 lần: Lần 1 vào thời điểm lúa thấp thỏ trổ; lần 2 khi ruộng lúa trổ thoát hoàn toàn.

Khuyến cáo nông dân dùng một trong các thuốc như: FELISO 360EC; FILIA 525SE; BEAM 75WP; KATANA 20SC; BUMP 650WP; KASOTO 200SC; BANKAN 600WP; ANGATE 75WP; FUARMY 40EC... để phòng trừ.

4. Bệnh khô vằn

Khi ruộng lúa có tỷ lệ bệnh từ 5% trở lên khuyến cáo nông dân nên dùng một trong các loại thuốc như: Anvil 5SC; Amistar top 325SC; Nevo 330EC; Validacin 5SL; Camilo 150 SC ... để phòng trừ.

* **Kỹ thuật pha thuốc và phun thuốc:** Thuốc trước khi phun cần được pha đều trong chai 0,5 - 1lít đậy nắp, lắc đều cho tan (dung dịch mẹ) sau đó mới cho vào trong bình và pha thêm nước cho đủ lượng nước thuốc cần phun. Khi phun thuốc phải đi xuôi theo chiều gió, đi chậm phun kỹ các tầng lá lúa, sau phun thuốc trong vòng 3 giờ nếu gặp mưa phải phun lại ngay theo đúng nồng độ hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Cục BVTV;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng NN các huyện; phòng kinh tế TP;
- Các phòng, trạm trực thuộc;
- Hợp tác xã KDDV nông nghiệp trong tỉnh;
- Lưu: VT.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Xuân Thanh