

Số: /TB-TTBVTV

Thái Bình, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Bệnh đạo ôn hại lúa và các biện pháp phòng trừ

Kính gửi: Các Hợp tác xã SXKDDV Nông nghiệp.

Hiện nay lúa xuân trong toàn tỉnh đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh, một bộ phận ở giai đoạn phân hoá đòng – làm đòng. Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của gió đông nam ẩm trên địa bàn tỉnh có mưa nhỏ, trời âm u, độ ẩm không khí cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh, phát triển.

Qua điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đến nay toàn tỉnh có khoảng 2.500 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, tập trung ở một số giống lúa nhiễm bệnh như: Nếp; TBR225, BC15, ... tỷ lệ bệnh trên giống nhiễm trung bình từ rải rác đến 3% số lá, nơi cao 10-20%, cá biệt 30-50% và đã xuất hiện các khóm lùn lụi trên nếp, TBR225, nhiều vết bệnh mới, vết bệnh cấp tính đang phát triển có khả năng lây nhiễm cao.

Dự báo: Với điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển, sinh trưởng của cây lúa đang ở giai đoạn mẫn cảm, thời gian tới bệnh đạo ôn sẽ gây hại nặng trên giống nhiễm nếu không có biện pháp phòng trừ hiệu quả, kịp thời.

Để đảm bảo an toàn sâu bệnh trên lúa vụ Xuân năm 2024, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo một số biện pháp kỹ thuật như sau:

1. Đối với bệnh đạo ôn lá

- Khuyến cáo nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng, giữ nước nông trên ruộng đẻ lúa làm đòng thuận lợi và tăng hiệu quả của việc phòng trừ bệnh, không phun các loại phân bón qua lá và các loại thuốc kích thích sinh trưởng đặc biệt trên những diện tích lúa đang bị nhiễm bệnh đạo ôn, không bón đạm đơn nuôi đòng nuôi hạt.

- Phun phòng trừ bệnh đạo ôn lá trên các giống nhiễm bệnh như Nếp, TBR225, BC15, ... khi ruộng lúa có tỷ lệ bệnh từ 5% trở lên.

- Đối với những diện tích lúa bị bệnh nặng trước khi phun thuốc cần vơ sạch những lá bị bệnh, sau khi phun thuốc từ 5 - 7 ngày cần kiểm tra lại, nếu thấy vết bệnh mới xuất hiện cần phun thuốc lại lần 2.

2. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông

Trước mắt đối với diện tích lúa trổ bông trước ngày 05/5 đặc biệt là trên các giống lúa nhiễm bệnh nhất thiết phải được phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông 2 lần:

Lần 1: Khi ruộng lúa thấp tho trổ;

Lần 2: Khi ruộng lúa trổ thoát hoàn toàn

Khuyến cáo nông dân nên sử dụng một trong các loại thuốc đặc hiệu để phòng trừ bệnh đạo ôn như: FILIA 525SE; BEAM 75WP; ANGATE 75WP; BUMP 650WP; KASOTO 200SC; BANKAN 600WP; FUARMY 40EC ... để phòng trừ.

** Lưu ý: Sau khi phun thuốc trong vòng 3 giờ nếu gặp mưa phải phun lại theo liều lượng và nồng độ ban đầu.*

Nhận được thông báo này đề nghị các Hợp tác xã SXKDDV Nông nghiệp tuyên truyền để nông dân thực hiện đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục BVTV; Cục Trồng trọt;
- Trung tâm BVTV phía Bắc;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND Huyện, Thành phố ;
- PhòngNN&PTNT huyện, phòng KT thành phố;
- Các phòng, trạm trực thuộc Chi cục;
- Lưu: VT, BVTV.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Xuân Thanh